

तुती लागवड तंत्रज्ञान

डॉ. भैर्यासाहेब गायकवाड
विषय विशेषज्ञ (किटकशास्त्र)
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, खामगाव

डॉ. दिप्ती पाटगावकर
कार्यक्रम समन्वयक
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, खामगाव

डॉ. हनुमान गरुड
विषय विशेषज्ञ
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, खामगाव



रेशीम उद्योग हा मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देणारा उद्योग आहे. या उद्योगामुळे शेतकऱ्यास दरमहा वेतनाप्रमाणे सहज व घरबसल्या उत्पन्न मिळू शकते. त्यांच्या घरातील वृद्ध, अपंग व्यक्ती, स्त्रिया, मुले हे सुध्दा या उद्योगात हातभार लाऊ शकतात. महाराष्ट्र राज्य रेशीम उत्पादक अपारंपारिक राज्यामध्ये आघाडीवर आहे.

२००७-०८ पासून रेशीम उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राने जम्मू-काश्मिर या पारंपारिक रेशीम उत्पादक राज्याला मागे टाकले. कर्नाटक, आंध्रपदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडु या राज्यांनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. या उद्योगास असणाऱ्या अनुकूल हवामानामुळे उद्योगाच्या प्रगतीला वाव असून मागील पाच वर्षात राज्यात रेशीम किटक संगोपनामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

कमीत कमी बागायत क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांपासून तो जास्तीत जास्त बागायत क्षेत्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना हा व्यवसाय चांगल्या रितीने करता येतो. दुग्धव्यवसाय, कुवकुट पालन यासारखे शेती पूरक व्यवसाय व ऊस, द्राक्षे यासारखी नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील हा व्यवसाय चांगल्या रितीने करता येतो.

हवामान:

- महाराष्ट्र राज्याचे कृषि विषयक हवामान तुती लागवडीसाठी योग्य आहे. तुती लागवड ही ७५० ते १००० मि.मी. पाऊस व समुद्रसपाटीपासून ३०० ते ९०० मी. उंचीपर्यंतच्या विभागात करता येते.
- तुती लागवडीस थंड व उष्ण दोन्हीही प्रकारचे हवामान मानवते. परंतु २५ ते ३२ सें. हे तापमान व ६५ ते ८० टक्के सापेक्ष आर्द्रता असणाऱ्या पोषक हवामानात तुतीची वर्षभर जोमाने वाढ होते व चांगले उत्पन्न घेता येते.

जमीन:

- तुती हे बहुवर्षीय पिक आहे. तुतीची लागवड एकदा केल्यानंतर १५ वर्षेपर्यंत जिवंत राहत असल्याने, दरवर्षी लागवड करावी लागत नाही त्यामुळे लागवडीचा खर्च इतर पिकाप्रमाणे वारंवार येत नाही.
- हलकी, मध्यम व भारी आशा कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीमध्ये तुतीची लागवड करता येते. मात्र तुतीच्या झाडाची मुळे खोलवर जात असल्यामुळे काळी कसदार किंवा मध्यम सपाट व पाण्याचा निचरा होणारी किंचीत उताराची जमीन लागवडीसाठी योग्य ठरते.
- तुती लागवड निचरा होणाऱ्या कोणत्याही जमिनीत करता येते.
- जमिनीचा सामु ६.५ ते ७ च्या दरम्यान असावा. चिबड व पाण्याचा निचरा न होणारी जमीन या पिकास योग्य नाही.

- तुतीस एप्रिल-मे महिन्यात पाणी मिळाले नाही तरी तुती मरत नाही. पाणी मिळाल्यानंतर तुती पुन्हा जोमाने वाढते. यामुळे आठमाही पाण्याची सोय असलेल्या शेतकऱ्यास देखील हा व्यवसाय करता येतो.

जमिनीची मशागत:

- जमिनीची पुर्व मशागतीची कामे उन्हाळ्यात मे महिन्यापुर्वीच पुर्ण करावे. म्हणजे जुन-जुलै महिन्यापर्यंत जमीन तयार करून लागवड करता येते.
- जमिन लोखंडी नांगराने किंवा ट्रॅक्टरच्या साह्याने १२ ते १५ इंच खोल नांगरट करावी.
- नांगरणी नंतर जमिन १५-२० दिवस तशीच तापु दयावी आणि काडी कचरा वेचुन ढेकळे फोडुन वखराच्या साह्याने समपातळीत करून घ्यावीत. त्यानंतर चांगले कुजलेले शेणखत किंवा कंपोष्ट खत जमिनीत सारख्या प्रमाणात पसरून घ्यावे.

वाणाची निवड:

- तुतीचे अनेक वाण प्रसारीत करण्यात आले आहेत. रेशीम उद्योगाच्या यशस्वी उत्पन्नाच्या ३८.२ टक्के भाग सकस तुती पानांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असल्याने लागवडीसाठी योग्य वाणाची निवड खुपच महत्वाची आहे.
- आज राज्यात एम-५, एस-३६, आणि एस-५४ या जातीची वाढ चांगली होऊन पानाचे अधिक उत्पादन मिळते.
- म्हैसुर येथे व्ही-१ ही सुधारीत जात विकसीत करण्यात आली असून या जातीचे एकरी पानाचे उत्पादन २०-२५ हजार किलो पर्यंत येऊ शकते. खताची वाढीव मात्रा व चांगल्या दर्जाच्या जमिनीमध्ये ही जात लागवडीस अत्यंत फायदेशीर आहे.

तुती बेण्याची निवड व प्रक्रिया:

- तुती लागवड ही तुती बेण्यापासून करावयाची असते. त्यासाठी साधारण ६ ते ८ महिने जुने व बागेस पाणी दिलेले तुतीचे बेणे म्हणून वापर करावा.
- या फांदया रंगाने भुरकट व आकाराने १०-१५ मि. मी. जाडीच्या १८ ते २० सें.मी. लांबीच्या आणि ३ ते ४ डोळे असलेल्या असाव्यात.
- कलमे तीक्ष्ण हत्याराच्या साह्याने, डोळ्यालगत तिरपा काप घेऊन तर वरच्या भागाचा काप सिकेटरच्या साह्याने डोळ्याच्या वर आडवा घ्यावा.
- लागवड कलमाचे २/३ भाग जमिनीच्या आत, १/३ भाग जमिनीच्या वर राहिल व कलम उलटे लागणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी.
- बुरशीपासून बचाव करण्यासाठी १ टक्के कार्बेन्डाझीम

(बाविस्टीन) द्रावणामध्ये तुतीचे बेणे अर्धा तास बुडवून ठेवावीत.

तुती लागवड पध्दत:

- वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी येथे केलेल्या संशोधनातून असे निदर्शनास आले की आय जे पध्दतीने (७x३) x २ फुट लागवड केल्याने भरपूर सुर्यप्रकाश व दोन ओळीतील अंतर जास्त असल्यामुळे पाल्याची प्रत चांगली राहते, आंतरमशागत सहज करता येते.
- या पध्दतीत झाडाची संख्या जास्त बसत असून एकरी १० गुंठे एवढ्याच क्षेत्राला पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे प्रति एकरी पाल्याच्या उत्पादनात ३ x ३ फुट लागवड पध्दतीपेक्षा दुपटीने वाढ होते.
- ठिंबक सिंचन करायचे झाल्यास पट्टा पध्दतीने अधिक सोईचे होते.
- त्याचबरोबर दोन एकर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर तुती लागवड आधुनिक पध्दतीने करावयाची असल्यास दोन पट्ट्यातील अंतर ६ ते ७ फुटापर्यंत वाढवता येते म्हणजे (६x३x२) किंवा (७x३x२) फुट अंतरावर केल्यास अंतर मशागत यंत्राच्या सहाय्याने करत येते.
- पट्टा पध्दतीमुळे तुतीची आंतरमशागत मजुराएवजी यांत्रिकी करणामुळे कमी खर्चात व कमी वेळेत वेळेवर करून घेता येते. यामुळे मजुरी खर्चात व वेळेत मोठ्या प्रमाणात बचत होते आणि उत्पादनात वाढ होऊन रेशीम किटकांना खादय फांदी पध्दतीने देणे सोईचे होते.
- पट्टा पध्दतीने लागवड केल्याने तुती शेतीत इतर आंतरपिके घेऊन उत्पन्नात भर घालता येते.
- पट्टा पध्दतीने लागवड केल्याने तुती लागवडीपासून पाल्याच्या उत्पादनात वाढ होते. पट्टा पध्दतीस अत्यंत कमी पाणी लागते. एक एकर ऊस लागणाऱ्या पाण्यात ३ एकर तुती जोपासता येते.

खताची मात्रा:

तुतीच्या दर्जेदार व भरपूर अन्नघटक युक्त पानांच्या उत्पादनासाठी शेणखतासोबत गरजेनुसार रासायनिक खतांची मात्रा देणे आवश्यक आहे. तुती बागेत माती परिक्षण करून रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी.

पानाची / फांद्यांची तोडणी:

- प्रथम वर्षी तुती लागवड झाल्यापासून साधारणपणे ३ ते ४ महिन्यात झाडांची वाढ चांगल्या प्रकारे होते व पाने रेशीम किटकांना देण्यास योग्य होतात.
- एक किलो कोष निर्मितीसाठी २० किलो पाला लागतो.
- पहिल्या वर्षी १ एकर बागेत पाल्याची साधारणपणे ३-४ हजार किलो पर्यंत व दुस-या वर्षापासून वानानुसार १२ ते १७ हजार किलो पर्यंत एकरी उत्पादन येते.
- एक एकर क्षेत्राची दोन भागात विभागणी करून अर्ध्या भागावर एक पिक या पध्दतीने स्वतंत्रपणे दोन पिके घेता येतात.
- फांद्याची एक तोडणी / छाटणी झाल्यानंतर ६० दिवसांत पुन्हा नवीन पिक घेता येते. यामुळे दुस-या बॅचमध्ये अंतर राहून त्याचा फायदा शेतीची कामे जसे निर्जुतीकरण, तुती बागेची कामे इत्यादीसाठी होतो व त्यामुळे उदयोग किचकटीचा वाटत नाही.

आंतर मशागत:

तुतीची लागवड केल्यानंतर बाण तणविरहीत ठेवण्यासाठी साधारणपणे पहिली १ ते १.७ व दुसरी २ ते २.७ महिन्यांनी खुरपणी करावी. (पहिल्या अडीच महिन्यापर्यंत बैलाच्या साह्याने आंतरमशागत करू नये) पानाच्या / फांद्या प्रत्येक तोडणीनंतर बैलाच्या साह्याने आंतर मशागत करता येते.

पाणी व्यवस्थापन:

- महाराष्ट्र राज्यात तुतीची लागवड जून ते ऑगस्ट महिन्यापर्यंत केली जाते आणि नवीन लागवडीस पावसाचा फायदा होतो.
- परंतु पावसाचा अनियमितपणा जाणवल्यास, जमिनीच्या प्रतीनुसार ८-१२ दिवसांच्या अंतराने नियमित पाळ्या द्याव्यात.
- पाण्याची कमतरता असेल तर ठिंबक सिंचनाचा वापर करता येऊ शकतो. प्रथमतः १-२ तास प्रति दिन संच जमिनीच्या मगदुरा प्रमाणे चालवावा.
- वरिल प्रमाणे आधुनिक पध्दतीने तुतीची लागवड केल्यास चांगल्या प्रतीचे तुतीची पाने रेशीम अळ्यास खाऊ घालून रेशीम कोषाचे भरघोस उत्पन्न घेता येईल.

पिक	शेणखत (टन)	नत्र (कि)	स्फुरद (कि)	पालाश (कि)
➤ लागवडीनंतर २ ते २.७ महिन्यांनी	२० : २० : २०	कि. नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति एकर		
➤ पहिल्या पिकानंतर १७ दिवसांनी	२० : ०० : ००	कि. नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति एकर		
➤ दुस-या वर्षापासून सेंद्रिय खत व खत पाच सम भागात विभागून प्रति एकरी द्यावा				
१	१.६	२८	१२	१२
२	१.६	२८	१२	१२
३	१.६	२८	१२	१२
४	१.६	२८	१२	१२
५	१.६	२८	१२	१२
	१.६	१४०	६०	६०



(संपर्क: +९१)